

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства



Торговое название: Траволайф.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: растительные пастилки.

Состав: каждая пастилка содержит:

Солодка голая (<i>Glycyrrhiza Glabra</i>)	10 мг;
Эмблика лекарственная (<i>Embllica Officinalis</i>)	10 мг;
Адатода сосудистая (<i>Adhatoda Vasica</i>)	10 мг;
Мята колосистая (<i>Mentha Viridis</i>)	5 мг;
Имбирь лекарственный (<i>Zingiber Officinale Roscoe</i>)	7 мг;
Ароматизированная сахарная основа	q.s.

Фармакологическая группа: отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ: R05X.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Комбинированный фитопрепарат с противовоспалительным и отхаркивающим действием. Эффекты препарата обусловлены свойствами входящих в его состав компонентов.

Солодка голая (*Glycyrrhiza Glabra*) оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Эмблика лекарственная (*Embllica Officinalis*) оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие.

Адатода сосудистая (*Adhatoda Vasica*) оказывает муколитическое, отхаркивающее и спазмолитическое действие.

Мята колосистая (*Mentha Viridis*) обладает прекрасными вкусовыми и лечебными свойствами. Мята содержит ментол - традиционный ингредиент, обладающий способностью успокаивать и смягчать раздраженное горло, обеспечивает приятный охлаждающий эффект. Этот эффект объясняется его местноанестезирующими свойствами в отношении слизистой оболочки горла.

Имбирь лекарственный (*Zingiber Officinale Roscoe*) обладает противовоспалительными и противоаллергическими свойствами.

Фармакокинетика:

Данные о фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания к применению:

Симптоматическая терапия острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем и болью в горле (фарингит, ларингит (в том числе «лекторский»), трахеит, бронхит).

Противопоказания:

x повышенная чувствительность к компонентам препарата;

x детям до 6 лет.

Применение при беременности и в период лактации:

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы:

Рекомендуется *взрослым и детям старше 6 лет* при появлении первых симптомов воспаления в полости рта и глотки.

Взрослым: по 1 пастилке каждые 2 часа. Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс лечения 2-3 недели.

Детям старше 6 лет: по 1 пастилке каждые 4 часа. Пастилку следует рассасывать до полного растворения.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции. В случае возникновения каких-либо необычных реакций прекратите прием препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка:

Передозировка маловероятна. Сообщений, относительно случаев передозировки, не поступало. Но, в случае случайного приема количества пастилок, превышающего суточную дозу, следует промыть желудок и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания:

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

Форма выпуска:

12 пастилок со вкусом (апельсина, меда, мяты), (лимона, меда, мяты) в блистере. Один блистер в картонной упаковке вместе с инструкцией по применению;

250 пастилок со вкусом (апельсина, меда, мяты), (лимона, меда, мяты) в индивидуальной полиэтиленовой упаковке вместе с инструкцией по применению в пластиковой банке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:

BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания

Производитель:
Лозен Фарма Пвт. Лтд.,
Промышленная зона KSSIDC,
имение Paгав, Шигаон Роуд,
Саванур - 581118, Индия

belinda.tj